

핵심술기 평가표

핵심술기명	3. 근육주사 (둔부의 복면, ventrogluteal site)						
성 명		학 번		소요시간	7분	난이도	중
평가 일자	2014년	월	일	평 가 자			

평가항목											총 점	평가 결과				
1		2		3		4		5								
단계별 수행		숙련도		지식수준		시간		태도 및 의사소통 능력								
* 포함 모든 항목 통과	40		상	30		우 수	10		우 수	10		언어적/비언어적 의사소통이 원활함	10		상	80점 이상
* 항목은 통과했으나 이외 항목 틀린 경우	30		중	20		미 흡	5		미 흡	5		언어적/비언어적 의사소통이 부분적으로 원활함	7		중	70~80점 미만
* 항목을 포함한 술기를 한 개라도 틀린 경우	20		하	10								원활하지 못함	5		하	70점 미만

근육주사 (둔부의 복면, ventrogluteal site)			
번호	수행항목	평가	
		P(1)	F(0)
1	대상자의 통증을 사정한다.		
2	손을 씻는다.		
3*	투약처방(투약카드 또는 컴퓨터 출력물 등)과 투약원칙(5 rights; 대상자 등록번호, 대상자명, 약명, 용량, 투여경로, 시간 등)을 확인한다.		
4*	근육주사에 필요한 약물을 정확한 용량 및 방법으로 주사기에 준비한다.		
5*	필요한 물품을 준비한다.		
6	대상자에게 간호사 자신을 소개한다.		
7*	대상자의 이름, 등록번호 등을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 대조하여 대상자를 확인한다.		
8	약물의 투여 목적과 작용 및 유의사항에 대해 설명한 다음 의문사항이 있으면 질문하도록 한다.		
9	사생활 보호를 위해 병상 간 커튼을 치거나 스크린을 친 다음 대상자의 수술 부위가 울리지 않도록 주의하고, 대상자를 옆으로 편안한 자세로 눕게 한다.		
10	손소독제로 손위생을 실시한다.		
11*	왼(오른)손의 손바닥을 대상자의 오른(왼)쪽 대전자 위에, 집게손가락은 전상장골극(anterior superior iliac spine)위에 올려놓고 가운데 손가락은 장골능을 따라 V자로 벌려서 주사 부위를 선정한다.		
12	두 손가락으로 만든 V자의 가운데 부위를 소독솜으로 안쪽에서 바깥쪽으로 직경 5-8cm 정도 둥글게 닦아낸다.		
13	소독약이 마르면 왼(오른)쪽 3,4번째 손가락 사이에 소독솜을 끼워 놓은 채, 오른(왼)손으로 주사기를 집어 올려 주사바늘 뚜껑을 제거한다.		
14*	주사바늘을 90° 로 유지한 다음 주사기로 둔부 근육을 재빨리 찌른다.		
15*	피부를 잡았던 손의 엄지와 집게손가락으로 주사기 바늘의 중심부를 잡고, 주사기를 잡았던 손으로는 주사기의 밀대를 뒤로 당긴다.		
16*	주사기로 혈액이 나오지 않는다면 주사기 밀대를 당겨보면 손의 엄지손가락으로 밀대를 밀어서 약물을 천천히 주입한다.		
17	약물 주입이 끝나면 왼(오른) 손가락에 끼워둔 소독솜으로 주사부위를 누르면서 둔부에 주사바늘 삽입할 때와 같은 각도로 주사기를 재빨리 빼낸다.		
18	주사부위를 마사지한다.		
19	주사 후의 기대효과에 대해 설명한다.		
20*	주사바늘은 뚜껑을 되씹우지 않은 채 손상성폐기물 전용요기에 버리고 사용했던 소독솜과 주사기는 일반 의료폐기물 전용용기에 버린다.		
21	손을 씻는다.		
22	수행 결과를 대상자의 간호기록지에 기록한다. 1) 5rights(대상자명, 약명, 용량, 투약경로, 투약시간) 2) 필요 시 투약목적, 환자의 반응, 투약 못한 이유		
총 점		점	